

***성분명 : 에키나시아엑스(Echinacea Extract)**

<분류번호 : 229, 일반>

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
효 능 효 과	(저작정제)(액제)(산제) 재발성 기도감염의 보조요법	(저작정제)(액제)(산제) 재발성 기도감염의 보조요법
용 법 용 량	(액제) 1.17 g/100g 특별한 의사의 지시가 없는 한 다음 용법, 용량을 따른다. - 성인: 10ml 씩 1일 3회 - 6세~12세 : 10ml 씩 1일 2회 - 2세~5세 : 5ml 씩 1일 3회 복용한다.	(액제) 1. 성인 및 12세 이상 소아 : 에키나시아엑스로서 1회 117 mg을 1일 3회 복용한다. 2. 6세 이상 12세 미만 소아 : 이 약으로서 1회 117 mg을 1일 2회 복용한다. 3. 4세 이상 6세 미만 소아 : 이 약으로서 1회 58.5 mg을 1일 3회 복용한다.

*성분명 : 에키나시아엑스(Echinacea Extract) (계속)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
<p>사 용 상 의 주 의 사 항</p>	<p>(저작정제)(액제)(산제)</p> <p>1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.</p> <p>1) 주성분, 부형제 등에 과민반응이 있는 환자</p> <p>2) 결핵, 백혈병, 교원질증, 다발성 경화증, AIDS, HIV감염, 기타 자가면역질환 등의 전신질환이 진행중인 환자</p> <p>2. 부작용</p> <p>발적, 가려움 등의 과민반응이나 드물게는 피부부종, 호흡곤란, 현기증, 저혈압 등의 증상이 나타날 수 있다.</p> <p>이 외의 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의하여야 한다.</p> <p>3. 일반적주의</p> <p>1) 8주이상 연용하여서는 안된다.</p> <p>2) 호흡곤란, 발열, 화농성 및 출혈이 있는 가래가 나오거나 지속될 경우 의사와 상담해야 한다.</p> <p>4. 임부 및 수유부</p> <p>임신중이거나 수유중인 경우 의사의 지시에 하에 투여하여야 한다.</p> <p>5. 저장상의 주의사항</p> <p>개봉 후 8주 동안 안정함</p>	<p>(저작정제)(액제)(산제)</p> <p>1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.</p> <p>1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람</p> <p>2) 결핵, 백혈병, 교원질증, 다발성 경화증, 만성사르코이드증, 만성바이러스질환, AIDS, HIV감염, 기타 자가면역질환 등의 전신질환이 진행중인 환자</p> <p>3) 6세 미만 소아(정제에 한함.)</p> <p>3') 4세 미만 소아(액제에 한함.)</p> <p>4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부</p> <p>2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.</p> <p>1) 피부 : 충혈되어 붉어짐, 가려움 등의 과민반응이나 드물게는 피부 부기 증상이 나타날 경우</p> <p>2) 호흡기계 : 호흡곤란, 발열, 화농성 및 출혈이 있는 가래가 나오거나 지속될 경우</p> <p>3) 순환기계 : 어지럼, 저혈압 등의 증상이 나타날 경우</p> <p>3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항</p> <p>8주이상 계속 복용하지 말 것.</p> <p>4. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.</p> <p>2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.</p> <p>3) 개봉 후 8주 동안 안정함.</p>