

구분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
02 배 합 성 분 및 함 량 (mg)	1캡슐 중 리소짐염산염 30 아스코르브산 150 카르바조크롬 2 토코페롤아세테이트50%(토코페롤 10 아세테이트2배산)	1캡슐 중 리소짐염산염 30 아스코르브산 150 카르바조크롬 2 토코페롤아세테이트50%(토코페 롤아세테이트2배산)
효 능 효 과	(캡슐제) 치은염(잇몸염)·치조(이틀)농루에 의한 여 러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부 기·출혈·통증)의 완화	(캡슐제) 치은염(잇몸염)·치조(이틀)농루에 의한 여 러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출 혈·통증)의 완화
용 법 용 량	(캡슐제) 성인 1회 1캡셀, 1일 3회 식후에 복용한다.	(캡슐제) 성인 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
<p>사 용 상 의 주 의 사 항</p>	<p>(캡슐제)</p> <p>1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.</p> <p>1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자</p> <p>2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자</p> <p>3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상 예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등을 일으킨 일이 있는 사람</p> <p>2. 부작용</p> <p>1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.</p> <p>2) 피부: 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안 증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.</p> <p>3. 일반적 주의</p> <p>1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.</p> <p>2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.</p> <p>4. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.</p> <p>2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀진하여 보관한다.</p> <p>3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.</p>	<p>(캡슐제)</p> <p>1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 15세 미만의 소아</p> <p>2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.</p> <p>1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람</p> <p>2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자</p> <p>3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람</p> <p>4) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람</p> <p>5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람</p> <p>3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.</p> <p>1) 이 약 복용 후 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타난 경우</p> <p>2) 피부 : 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상모양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우</p> <p>3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우</p> <p>4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.</p> <p>5. 저장상의 주의사항</p> <p>1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.</p> <p>2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.</p>