

## ○ 효능·효과

치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료

## ○ 용법·용량

성인 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

## ○ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상 (예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 4) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약 복용 후 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타난 경우
- 2) 피부 : 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상모양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우

3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 장기간 계속하여 사용하지 말 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

※ 변경대비표

항 목	기 허 가 사 항	변 경 사 항
효능·효과	치은염(잇몸염)·치조(이틀)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·통증)의 완화	치주치료후 치은염, 경·중등도 치주염의 <u>보조치료</u>
사용상의 주의사항	1 ~ 3. (생략) 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 < 신설 > 5. (생략)	1 ~ 3. (전과 동일) 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) <u>장기간 계속하여 사용하지 말 것</u> 5. (전과 동일)