

‘사용상의 주의사항’ 변경대비표

플루라제팜(경구)

변경전	변경후
<p>1. 경고</p> <p>1)~2) (생략)</p> <p><u><신설></u></p>	<p>1. 경고</p> <p>1)~2) (좌동)</p> <p><u>3) 마약류와 벤조디아제핀계 약물의 병용투여 시 위험성</u> <u>마약류와 이 약의 성분인 플루라제팜을 포함한 벤조디아제핀계 약물의 병용투여는 진정, 호흡억제, 혼수상태 및 사망을 초래할 수 있다. 이러한 위험성 때문에, 마약류와 벤조디아제핀계 약물의 병용투여는 적절한 대체 치료방법이 없는 환자의 경우에 한하여 처방하도록 한다.</u> <u>이 약과 마약류의 병용투여가 결정되면 최저 유효용량으로 최단 기간 처방하도록 하고 호흡억제 및 진정의 징후와 증상에 대해 환자를 면밀히 추적 관찰하도록 한다.</u></p>
<p>2.~5. (생략)</p>	<p>2.~5. (좌동)</p>
<p>6. 상호작용</p> <p>1) (생략)</p> <p><u><신설></u></p>	<p>6. 상호작용</p> <p>1) (좌동)</p> <p><u>2) 이 약을 포함한 벤조디아제핀계 약물과 마약류의 병용투여는, 상가적인 중추신경계 억제 효과로 인해 진정, 호흡억제, 혼수상태 및 사망의 위험성을 증가 시킨다. 벤조디아제핀계 약물과 마약류의 병용투여 시 투여용량 및 투여기간을 제한하도록 한다.</u></p>
<p>2)~5) (생략)</p>	<p><u>3)~6) (좌동)</u></p>
<p>(이하 생략)</p>	<p>(좌동)</p>