

<분류번호 629>

## 아시클로버(경구제)(Acyclovir)

### ▶용법·용량

기 허가사항	변경사항
<p>○ 성인 ~ ○ 소아 &lt;기 허가사항과 동일&gt;</p> <p>○ 신장애 환자</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 대상포진 바이러스 감염증의 치료</p> <p>심한 신장애 환자(크레아티닌 청소율이 분당 10mL 미만)는 이 약으로서 1회 800mg 1일 3~4회, 약 6~8시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.</p>	<p>○ 성인 ~ ○ 소아 &lt;좌동&gt;</p> <p>○ 신장애 환자</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 대상포진 바이러스 감염증의 치료</p> <p>1) 크레아티닌 청소율이 분당 10mL 미만인 환자는 이 약으로서 1회 800mg 1일 2회, 약 12시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.</p> <p>2) 크레아티닌 청소율이 분당 10~25mL는 환자는 이 약으로서 1회 800mg 1일 3회, 약 8시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.</p>

### ▶사용상의 주의사항

기 허가사항	변경사항
<p>1. ~ 3. &lt;기 허가사항과 동일&gt;</p> <p>4. 일반적 주의</p> <p>1)~4) &lt;기 허가사항과 동일&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;이하 기 허가사항과 동일&gt;</p>	<p>1. ~ 3. &lt;좌동&gt;</p> <p>4. 일반적 주의</p> <p>1)~4) &lt;좌동&gt;</p> <p>5) 재발성 생식기 포진 치료는 생식기 포진의 발병을 반복하는 환자(면역 능력이 있는 환자, 적어도 6회 이상 반복되는 환자)를 대상으로 하며, 또한 이 약을 1년간 투여 한 후에는 계속 투여할지 여부를 검토해야한다.</p> <p>6) 의식 장애 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계 조작에 주의하도록 환자에게 충분히 설명한다. 또한, 신장애 환자는 특히 의식 장애 등이 나타나기 쉬우므로 환자의 상태에 따라 주의해야한다.</p> <p>&lt;좌동&gt;</p>