

<분류번호 629>

아시클로버(경구제)(Acyclovir)

▶ 용법·용량

기 허가사항	변경사항
<p>○ 성인 ~ ○ 소아 <기 허가사항과 동일></p> <p>○ 신장애 환자</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 대상포진 바이러스 감염증의 치료</p> <p>1) 크레아티닌 청소율이 분당 10mL 미만인 환자는 이 약으로서 1회 800mg 1일 2회, 약 12시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.</p> <p>2) 크레아티닌 청소율이 분당 10~25mL는 환자는 이 약으로서 1회 800mg 1일 3회, 약 8시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.</p>	<p>○ 성인 ~ ○ 소아 <좌동></p> <p>○ 신장애 환자</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 대상포진 바이러스 감염증의 치료</p> <p>1) 크레아티닌 청소율이 분당 10mL 미만인 환자는 이 약으로서 1회 800mg 1일 2회, 약 12시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.</p> <p>2) 크레아티닌 청소율이 분당 10~25mL인 환자는 이 약으로서 1회 800mg 1일 3회, 약 8시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.</p>