

## 클로베타솔/니스타틴/네오마이신 복합제

### 사용상의 주의사항

#### 7. 소아에 대한 투여

- 1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 흡수가 증가될 수 있으므로 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육 장애, [두개내압항진](#) 등이 나타나기 쉬우므로 추천되지 않는다.
- 2) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.

#### 클로베타솔 단일제(액상분무제) 허가사항 변경대비표

항 목	기 허 가 사 항	변 경 사 항
7. 소아에 대한 투여	1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 흡수가 증가될 수 있으므로 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육 장애, <신설> 등이 나타나기 쉬우므로 추천되지 않는다. 2) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.	1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 흡수가 증가될 수 있으므로 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육 장애, <a href="#">두개내압항진</a> 등이 나타나기 쉬우므로 추천되지 않는다. 2) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.