어린이 안전포장 개봉방법

강하게
누르세요

강한진통 + 신속한 근이완작용

리리스정

일반의약품
분류번호 114

■ **원료약품 및 그 분량** : 이 약 1정 중
유효성분 : 아세트아미노펜(KP) ····· 300mg
클로르족사존(KP) ····· 250mg
첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색203호 알루미늄레이크
첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소의 기름)
기타 첨가제 : 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨, 오파드라이 흰색 (85F18422)

■ **성상 :** 담황색의 장방형 필름코팅정제

■ **효능 · 효과**
신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌(삠)통, 견통(어깨통증), 근경련(근육경련), 근경직(굳음) 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질환(여러 질환)

■ **용법 · 용량**
성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈 속)시를 피하여 복용한다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 클로르족사존에 과민증 환자
2) 아세트아미노펜에 과민증 환자

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 심한 간 · 신장애(신장(콩팥)장애) 환자
2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

5. 부작용
1) 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈(피부에 검보랏빛 얼룩점이 생기는 내부 출혈), 요변색(소변색이 변함) 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있다.
2) 간장 : 클로르족사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다.
3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.
4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6. 임부에 대한 투여
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌다)한다고 판단되는 경우 투여한다.

7. 상호작용
알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께 복용(사용))투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여한다.

■ **저장방법** : 밀폐용기, 상온(15~25℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ **포장단위** : 10정

■ **첨부문서 최종 개정일 :** 2018년 12월 3일

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

20-9-10-C

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의 · 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 http://www.nicepharma.com에서 확인하실 수 있습니다.

고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10