

조혈비타민 3종 보강 빈혈치료제 산타몬플러스 캡슐

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1캡슐 중

유효성분 : 글루콘산제이철나트륨착염(KP)	99.4mg[철(Ⅲ)로서 35mg]
시아노코발라민(KP)	500μg
폴산(KP)	500μg
피리독신염산염(KP)	50mg

첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘 또는 돼지의 기름

기타 첨가제 : 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산, 탈크, 인산일수소나트륨, 캡슐

■ 성상 : 갈색 내지 적갈색의 분말 및 과립이 들어 있는 상 · 하부 보라색의 경질캡슐제

■ 효능 · 효과

1. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
2. 다음 경우의 비타민 B₆의 보급
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 다음 증상의 완화(비타민 B₆ 함유 제제) : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

■ 용법 · 용량 : 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐씩 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고
철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이(갓난아기)
 - 3) 혈액소중(혈대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
 - 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부(배부분) · 위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 현수
 - 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경 계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전(장애), 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고, 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온보관(1~30℃) (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ **포장단위** : 60캡슐/병, 120캡슐(60캡슐x2)/병

■ **첨부문서 최종 개정일** : 2022년 3월 15일

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

22-3-22-C

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10