

클로베타솔 단일제(액제/용액/연고/크림/로션)

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 함

- 1) 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등)·동물(웜, 사면발니 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 3) 고막 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유 지연이 나타날 수 있다)
- 4) 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다.)
- 5) 두피 감염, 입 주위 피부염, 보통 여드름, 주사(딸기코, rosacea) 환자
- 6) 항문·생식기 가려움 환자
- 7) 24개월 미만의 영아

6. 소아에 대한 투여

- 1) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱 증후군, 발육 장애, 두개내압항진 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다. 특히, 밀봉봉대법을 사용하지 않아도 부신 억제가 나타날 수 있으므로 가능한 장기간 연용을 피한다. 소아에 이 약 사용 시는 매주 투약 지속 여부를 평가하는 것이 바람직하다.
- 2) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있고 약물의 흡수를 증가시키므로 주의한다.
- 3) 24개월 이상 18세 미만의 소아에 대한 투여는 권장되지 않는다.

클로베타솔 단일제(액제/용액/연고/크림/로션) 허가사항 변경대비표

항 목	기 허가 사항	변 경 사 항
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.	1)~6)(기 허가사항과 동일) 7) 1세 이하의 영아	1)~6)(좌동) 7) <u>24개월 미만의</u> 영아
6. 소아에 대한 투여	1)~2)(기 허가사항과 동일) 3) 12세 이하의 소아에 대한 투여는 권장되지 않는다.	1)~2)(좌동) 3) <u>24개월 이상 18세 미만의</u> 소아에 대한 투여는 권장되지 않는다.