

멀티큐텐에이치티정

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중

유효성분 : 유비데카레논(KP)	10mg
벤포티아민(KP)	10mg
푸르실티아민(KP)	20mg
폴산(KP)	0.5mg
시아노코발라민1000배산(KP)	2.4mg(시아노코발라민으로서 2.4μg)
콜레칼시페롤과립(별규)	10mg(비타민D ₃ 로서 1,000IU)
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	100mg(비타민E로서 50IU)
무수인산수소칼슘(USP)	203.69mg(칼슘으로서 60mg)
황산칼륨(KP)	111.42mg(칼륨으로서 50mg)
산화마그네슘(KP)	99.47mg(마그네슘으로서 60mg)
산화아연(KP)	49.8mg(아연으로서 40mg)

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(돼지의 피부, 소의 가죽)

기타 첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탭크, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 오파드라이AMBI노란색(88A520046)

■ 성상 : 노란색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능·효과

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁₂의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육보양
 - 구루병의 예방
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로

2. 아연의 보급

■ 용법·용량 : 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 고칼슘혈증 환자
- 5) 신장결석 환자
- 6) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 5) 심장·순환기계 기능장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 9) 알칼리증, 소화성궤양 환자
- 10) 신장결석 병력이 있는 환자
- 11) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 구내염(입안염), 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 고칼슘혈증, 가스창, 위장통증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 120정/상자(60정(10정/PTPX6)/상자X2)

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2020년 7월 21일

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

20-8-10

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.

