어린이 안전포장 개봉방법 강하게 누르세요

효과빠른 코감기약

か世五

일반의약품 분류번호 114

■ 원료약품 및 그 분량: 이 약 1정 중

유효성분 : 아네트이미노펜(KP) 500mg 슈도에페드린염산염(USP) 30mg 클로르페니라민말레산염(KP) 2mg

첨가제(동물유래성분): 스테아르산마그네슘(소 또는 돼지의 기름)

기타 첨가제 : 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 경질무수규산, 오파드라이 흰색(85F18422)

- 성상: 흰색의 장방형 필름코팅정제
- 효능·효과: 감기의 제증생(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
- 용법·용량: 성인 및 12세 이상의 어린이: 매 6시간마다 2정 복용, 최대 하루 8정을 초과할 수 없다.

■ 사용상의 주의사항

1 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 하고, 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.
- 2) 수도에페드린 함유 의약품 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
- 2 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.
 - 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg) 을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
- 3. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
 - 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 4. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 가지고 있는 사람
 - 2) 지금까지 이 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영어(갓난아기) · 유아 및 14세 이하의 어린이
 - 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 5) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변을 눔)곤란이 있는 사람
 - 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

5. 복용 시 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등.

- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
- 5)이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다는 보고가 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족(손발)이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP), 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.
 - ④ 천식이 나타난 경우
 - ⑤ 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 6) 바르비탈계 약물. 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트이미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 괴랑투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

6. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발젝(충혈되어 붉어진), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증(어지러움) 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사. 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
- 3) 수회(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 4) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

7, 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- 저장방법: 기밀용기, 실온보관(1~30°C) (사용기간: 제조일로부터 36개월)
- **포장단위**: 10정/PTP
- 첨부문서 최종 개정일: 2022년 01월 03일
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

22-2-28-C

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 http://www.nicepharma.com에서 확인하실 수 있습니다.