

텍시부프로펜(경구) 허가사항 변경 대비표

□ 일반의약품(경구), 전문의약품(경구)

항목	기 허가사항	변경사항
사용상의 주의사항	<p>해당번호. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 약사와 상의 할 것</p> <p>4) 피부 : 다형홍반, 전신홍반루푸스(SLE), 탈모, 때때로 혈관부종, 드물게 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군) 및 독성표피괴사증(리엘증후군), <u><추가></u>이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지할 것</p>	<p>해당번호. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 약사와 상의 할 것</p> <p>4) 피부 : 다형홍반, 전신홍반루푸스(SLE), 탈모, 때때로 혈관부종, 드물게 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군) 및 독성표피괴사증(리엘증후군), <u>빈도불명의 호산구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군)</u>이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지할 것</p>

□ 일반의약품(경구, 시럽제)

항목	기 허가사항	변경사항
사용상의 주의사항	<p>해당번호. 이상반응</p> <p>4) 피부 : 드물게 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군) 또는 리엘증후군(중독성표피괴사증), <u><추가></u>이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.</p>	<p>해당번호. 이상반응</p> <p>4) 피부 : 드물게 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군) 또는 리엘증후군(중독성표피괴사증), <u>빈도불명의 호산구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군)</u>이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.</p>